



# LE VIH

Infection Sexuellement Transmissible



## LE DÉPISTAGE DU VIH EN LABORATOIRE C'EST SANS ORDONNANCE ET SANS AVANCE DE FRAIS !

### • LE VIH, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine (HIV en anglais), est responsable du SIDA. Il s'attaque au système immunitaire, notamment en détruisant les lymphocytes CD4.

→ Les personnes infectées sont donc plus vulnérables aux maladies et aux infections.

[ Actuellement, on estime à **173 000** le nombre de français vivant avec le VIH. ]

### • LE SIDA, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le SIDA, ou syndrome d'immunodéficience acquise, désigne le stade le plus avancé de l'infection par le VIH.

→ À ce stade, et sans traitement, l'organisme est très fragile.

## QUELLES SONT LES VOIES DE TRANSMISSION ?

Le VIH peut être contracté suite à :

- Des rapports sexuels non protégés
- L'utilisation (ou l'échange) de seringues contaminées
- Par transfusion (exceptionnellement)



Une femme séropositive, non traitée, peut transmettre le virus à son enfant :

- Pendant la grossesse
- Lors de l'accouchement
- En l'allaitant



→ La contagiosité est maximale au début de l'infection.

## QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

La contamination passe souvent inaperçue. En cas de symptômes, ils apparaissent 1 à 4 semaines après la contamination : **fièvre** et **fatigue** sont souvent accompagnées d'une **angine** et de **ganglions**, et parfois d'une **éruption cutanée**.



Sans traitement, ces symptômes peuvent disparaître pendant plusieurs mois ou années puis d'autres symptômes peuvent apparaître : c'est le stade du SIDA.

## COMMENT PEUT-ON S'EN PROTÉGER ?

Pour se protéger (de toutes les IST) et protéger les autres, il faut utiliser des **préservatifs** et se faire **dépister** après un rapport à risque.

La **PrEP** est un moyen de prévention de l'infection par le VIH reposant sur la prise d'un médicament (disponible sur ordonnance). Il est recommandé chez les personnes ayant des conduites à risques d'infections (personnes non infectées n'utilisant pas systématiquement le préservatif et appartenant aux populations particulières à risque d'infection).

## EN QUOI CONSISTE LE DÉPISTAGE ?

Le dépistage du VIH repose sur la recherche des anticorps contre le **VIH-1** et le **VIH-2** ainsi que de l'**antigène P24** du virus.

Il peut s'effectuer dans un laboratoire, par **prise de sang**, **dès 15 jours après la dernière prise de risque**. Le test est à renouveler après 6 semaines.



Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour effectuer cette prise de sang.

**Faire un test de dépistage, au laboratoire, est le seul moyen fiable de diagnostiquer une infection par le VIH pour :**

- Être mis sous traitement
- Ne plus transmettre le virus
- Éviter l'évolution de la maladie



## Le saviez-vous ?

À l'heure actuelle, les traitements permettent de vivre avec le VIH.

**Protégez-vous ! Dépistez-vous !**

Pour + d'info santé et de conseils, scannez le QR code !



[www.biolbs.fr](http://www.biolbs.fr)

